NOMBRES COMPLEXES
(PARTIE 1)

Les nombres complexes prennent naissance au XVIème siècle lorsqu'un italien *Gerolamo Cardano* (1501 ; 1576), ci-contre, au nom francisé de *Jérôme Cardan*, introduit $\sqrt{-15}$ pour résoudre des équations du troisième degré.
En 1572, un autre italien, *Rafaele Bombelli* (1526 ; 1573) publie "*Algebra, parte maggiore dell'aritmetica, divisa in tre libri*" dans lequel il présente des nombres de la forme $a+b\sqrt{-1}$ et poursuit les travaux de *Cardan* sur la recherche de solutions non réelles pour des équations du troisième degré.
A cette époque, on sait manipuler les racines carrées d'entiers négatifs mais on ne les considère pas comme des nombres.
Lorsqu'une solution d'équation possède une telle racine, elle est dite imaginaire.
La notation *i* apparaît en 1777 siècle avec *Leonhard Euler* (1707 ; 1783) qui développe la théorie des nombres complexes sans encore les considérer comme de « vrais » nombres. Il les qualifie de nombres impossibles ou de nombres imaginaires.
Au XIXe siècle, *Gauss* puis *Hamilton* posent les structures de l'ensemble des nombres complexes. Les nombres sans partie imaginaire sont un cas particulier de ces nouveaux nombres. On les qualifie de « réel » car proche de la vie. Les complexes sont encore considérés comme une création de l'esprit.

I. L'ensemble $\mathbb{C}$

1) Définition

Définition : Il existe un ensemble de nombres, noté $\mathbb{C}$, appelé ensemble des nombres complexes qui possède les propriétés suivantes :
- $\mathbb{C}$ contient $\mathbb{R}$.
- Dans $\mathbb{C}$, on définit une addition et une multiplication qui suivent les mêmes règles de calcul que dans $\mathbb{R}$.
- Il existe dans $\mathbb{C}$ un nombre i tel que $i^2=-1$.
- Tout élément z de $\mathbb{C}$ s'écrit de manière unique sous la forme $z=a+ib$ avec a et b réels.

- **Exemples :**

$3+4i$; $-2-i$; $\frac{i}{3}$ sont des nombres complexes.

➢ **Vocabulaire :**
- L'écriture $a+ib$ d'un nombre complexe z est appelée la forme algébrique de z.

- Le nombre a s'appelle la partie réelle et la nombre b s'appelle la partie imaginaire.
  On note $\mathrm{Re}(z)=a$ et $\mathrm{Im}(z)=b$.

➢ **Remarques :**

- Si $b=0$ alors z est un nombre réel.
- Si $a=0$ alors z est un nombre imaginaire pur.

Méthode : Effectuer des calculs sur les nombres complexes

Calculer et exprimer le résultat sous la forme algébrique.

$z_1=3-5i-(3i-4)$ $\quad z_2=(3-2i)(-1+5i)$ $\quad z_3=(2-3i)^2$

$z_4=(2i)^{13}$ $\quad z_5=\dfrac{1}{4-2i}$ $\quad z_6=\dfrac{1+i}{2-i}$

$z_1=3-5i-(3i-4)$
$=3-5i-3i+4$
$=7-8i$

$z_2=(3-2i)(-1+5i)$
$=-3+15i+2i-10i^2$
$=-3+15i+2i+10$
$=7+17i$

$z_3=(2-3i)^2$
$=4-12i+9i^2$
$=4-12i-9$
$=-5-12i$

$z_4=(2i)^{13}$
$=2^{13}i^{13}$
$=8192\times(i^2)^6\times i$
$=8192\times(-1)^6\times i$
$=8192i$

$z_5=\dfrac{1}{4-2i}$
$=\dfrac{4+2i}{(4-2i)(4+2i)}$
$=\dfrac{4+2i}{16-4i^2}$
$=\dfrac{4+2i}{16+4}$
$=\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{10}i$

$z_6=\dfrac{1+i}{2-i}$
$=\dfrac{(1+i)(2+i)}{(2-i)(2+i)}$
$=\dfrac{(1+i)(2+i)}{4+1}$
$=\dfrac{1}{5}(2+i+2i-1)$
$=\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{5}i$

Propriétés :

a) Deux nombres complexes sont égaux, si et seulement si, ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire.

b) Un nombre complexe est nul, si et seulement si, sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles.

- **Exemple d'application :**

Déterminons le nombre complexe z vérifiant $2z-5=4i+z$.

On a donc :

$2z-z=5+4i$

$z=5+4i$

2) Représentation dans le plan complexe

Dans tout le chapitre, on munit le plan d'un repère orthonormé direct $\left(O;\vec{u};\vec{v}\right)$.

Définitions : a et b sont deux nombres réels.
- A tout nombre complexe $z=a+ib$, on associe le point M de coordonnées $(a;b)$ et le vecteur $\vec{w}$ de coordonnées $(a;b)$.
- A tout point M$(a;b)$ et à tout vecteur $\vec{w}\,(a;b)$, on associe le nombre complexe $z=a+ib$ appelé affixe du point M et affixe du vecteur $\vec{w}$.

On note M(z) et $\vec{w}$ (z).

- **Exemple :**

Le point M(3 ; 2) a pour affixe le nombre complexe $z=3+2i$.
De même, le vecteur $\vec{w}$ a pour affixe $z=3+2i$.



Propriétés : M(z_M) et N(z_N) sont deux points du plan.
$\vec{u}$ (z) et $\vec{v}$ (z') sont deux vecteurs du plan.

a) Le vecteur $\overrightarrow{MN}$ a pour affixe z_N-z_M.

b) Le vecteur $\vec{u}+\vec{v}$ a pour affixe $z+z'$.

c) Le vecteur $k\vec{u}$, k réel, a pour affixe kz.

d) Le milieu I du segment $[MN]$ a pour affixe $z_I=\dfrac{z_M+z_N}{2}$

- **Autres exemples :**



II. Conjugué d'un nombre complexe

Définition : Soit un nombre complexe $z = a + ib$.
On appelle nombre complexe conjugué de z, le nombre, noté $\bar{z}$, égal à $a - ib$.

- **Exemples :**

- $z = 4 + 5i$ et $\bar{z} = 4 - 5i$
- On peut également noter : $\overline{7 - 3i} = 7 + 3i$; $\bar{i} = -i$; $\bar{5} = 5$

➢ **Remarque :**

Les points d'affixes z et $\bar{z}$ sont symétriques par rapport à l'axe des réels.



Propriétés : Soit z et z' deux nombres complexes et n entier naturel non nul.

a) $\overline{\bar{z}} = z$

b) $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$

c) $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z'}$

d) $\overline{z^n} = \bar{z}^{\,n}$

e) $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}$, $z \neq 0$

f) $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}}$, $z' \neq 0$

Propriétés :
a) z est réel $\Leftrightarrow z = \bar{z}$

b) z est imaginaire pur $\Leftrightarrow z = -\bar{z}$

Propriété : Soit $z = a + ib$ un nombre complexe alors $z\bar{z} = a^2 + b^2$.

Méthode : Déterminer un conjugué
Déterminer le conjugué des nombres suivants et exprimer le résultat sous la forme algébrique.

$$z_1 = (2 - i)(i - 5) \qquad z_2 = \frac{3 + 2i}{i}$$

$$\overline{z_1} = \overline{(2-i)(i-5)}$$
$$= \overline{(2-i)}\,\overline{(i-5)}$$
$$= (2+i)(-i-5)$$
$$= -2i-10+1-5i$$
$$= -9-7i$$

$$\overline{z_2} = \overline{\left(\frac{3+2i}{i}\right)}$$
$$= \frac{\overline{3+2i}}{\overline{i}}$$
$$= \frac{3-2i}{-i}$$
$$= \frac{(3-2i)\times i}{-i\times i}$$
$$= 2+3i$$

III. Equations du second degré dans $\mathbb{C}$

Définition : Soit a, b et c des réels avec $a \neq 0$.
On appelle discriminant du trinôme az^2+bz+c, le nombre réel, noté Δ, égal à b^2-4ac.

Propriété :
- Si $\Delta > 0$: L'équation $az^2+bz+c=0$ a deux solutions réelles distinctes :

$$z_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- Si $\Delta = 0$: L'équation $az^2+bz+c=0$ a une unique solution réelle : $z_0 = -\frac{b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$: L'équation $az^2+bz+c=0$ a deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$

Méthode : Résoudre une équation dans $\mathbb{C}$.
Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes : a) $z^2+5=0$ b) $z^2+3z+4=0$

a) $z^2+5=0$
$\Leftrightarrow z^2=-5$
$\Leftrightarrow z^2=5i^2$
$\Leftrightarrow z=i\sqrt{5}$ *ou* $z=-i\sqrt{5}$
Les solutions sont donc $-i\sqrt{5}$ et $i\sqrt{5}$.

b) $z^2+3z+4=0$
On calcule de discriminant Δ du trinôme : $\Delta = 3^2-4\times1\times4=-7$

$\Delta<0$ donc l'équation admet deux solutions complexes conjugués :

$$z_1 = \frac{-3+i\sqrt{7}}{2} = -\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{7}}{2}i \text{ et } z_2 = \frac{-3-i\sqrt{7}}{2} = -\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{7}}{2}i$$